


## 漁業者の皆様へ

### 徳山湾でヘテロシグマ アカシオが 発生しています!

発生日	令和5年(2023年)5月15日(月)
発生海域	徳山湾
赤潮構成種	ヘテロシグマ アカシオ( <i>Heterosigma akashiwo</i> ) (好適水温:20~24℃、好適塩分:22~29psu)
着色海域の色	茶褐色



大きさ:8~25μm×6~15μm

調査結果		
観測場所	細胞数	備考
下松市栽培漁業センター前	0個/ml	5月15日 17.9℃ 水深0m
櫛ヶ浜港	16,833個/ml	5月15日 20.5℃ 水深0m
徳山港(周南地方卸売市場水産物市場前)	1,883個/ml	5月15日 20.8℃ 水深0m
山口県漁協新南陽市支店前	155,000個/ml	5月15日 22.0℃ 水深0m
平野港	140,500個/ml	5月15日 24.0℃ 水深0m

【赤潮注意報:5,000個/ml以上、赤潮警報(魚類へい死目安):50,000個/ml】

#### 特記事項

- 本種は、水深の浅い海域では上下動を繰り返し、日中は表層に、夜間は底層に濃密に滞留します。
- 本種は、日中は光合成による過飽和酸素状態に、朝方は増殖・呼吸等による貧酸素状態にさせて、魚類をへい死させる有害プランクトンです。
- 本種赤潮の主な発生時期は、5~7月(梅雨時期)と10月(秋雨時期)です。

#### 留意事項

- 今後は、漁港内での蓄養は避けて、活けメ出荷等の対策を講じてください。また、養殖魚等は深い生け簀を活用し、赤潮発生時には代謝を抑えるために餌止めをし、早期出荷などの対策も検討してください。
- 漁船の活け間内のスカッパを閉めて航行するなど、赤潮を含んだ海水が流入しないよう注意してください。
- なお、県は引き続き調査を実施して参りますので、赤潮の発生・魚介類のへい死などが確認された場合は、漁協を通じて関係市・農林水産事務所水産部に速やかに通報してください。
- また、赤潮による漁獲物のへい死等については、漁業被害救済基金の対象となる場合がありますので、漁獲物の処分等を行わず(被害数量等の確認が必要のため)、速やかに漁協を通じて関係市町・農林水産事務所水産部に通報してください。

※県内の赤潮情報については、海鳴りネットワークのホームページでもご覧いただけます。  
→<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/108/21929.html>