

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	うどんこ病	つる枯病	べと病	疫病	灰色かび病	褐斑病	菌核病	黒星病	炭疽病	斑点細菌病	苗立枯病 (リンクトニア菌)	つる割病	備考
--------	--------	-----	-----	-------	------	-----	----	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------------------	------	----

定植後・殺菌剤

1	テオファネートメチル ペースト剤	トップジンMペースト		○												
	テオファネートメチル水 和剤	トップジンM水和剤	○	○			○	○	○	○						
	ベノミル水和剤	ベンレート水和剤		○			○	○	○				※			※定植前～定植 後1か月(灌注)
2	プロシミドン水和剤	スミレックス水和剤		○			○	○								ハクサイ、ダイコ ン、ストックには薬 害を生じる恐れが あるので付近にあ る場合は注意す る。
3	トリホリン乳剤	サブロール乳剤	○													
	トリフルミゾール水和剤	トリフミン水和剤	○							○						
	フェナリモル水和剤	ルビゲン水和剤	○													
	ジフェノコナゾール水和 剤	スコア顆粒水和剤	○							○						
M03 4	マンゼブ・メタラキシルM 水和剤	リドミルゴールドMZ			○											発病初期の1回程 度の散布とマンゼ ブ剤等との体系防 除が効果面、耐性 菌対策上有効で ある。
4 M05	メタラキシルM・TPN水和 剤	フォリオゴールド	○	○			○									
7	ペンチオピラド水和剤	アフエットフロアブル	○				○	○								
	イソピラザム水和剤	ネクスターフロアブル	○				○	○	○							
	ピラジフルミド水和剤	バレード20フロアブル	○				○	○	○							
	イソフェタミド水和剤	ケンジャフロアブル	○	○			○	○	○							
7 M05	ペンチオピラド・TPN水 和剤	ベジセイバー	○	○			○	○	○	○						ストレプトマイシン 剤およびホセチル 剤と混用する場 合、必ず本剤を先 に所定の濃度に 希釈してからそれ ぞれの剤を加える こと
U08	ピリオフェノン水和剤	プロバティフロアブル	○													
U17	ピカルブトラゾクス水和 剤	ピシロックフロアブル			○											
9	メパニピリム水和剤	フルピカフロアブル	○				○	○								
10 1	ジエトフェンカルブ・ベノ ミル水和剤	ニマイバー水和剤					○	○	○	○						
11 M05	アゾキシストロピン・TP N水和剤	アミスターオブティフロア ブル	○	○			○	○	○	○	○					

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	ア	ワ	コ	オ	ア	ミ	ミ	ハ	ウ	ハ	ト	ウ	ス	ハ	カ	ネ	ク	備考
				ブラ	タ	ナ	ン	ザ	カ	ナ	ダ	リ	モ	ジ	ス	マ	ム	コ	ロ		

定植後・殺虫剤

5		脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤	ダブルシューターSE			○	○				○	○	○									
19		ポリオキシシン水溶剤	ポリオキシシンAL水溶剤					○			○											
M01	不明	DBEDC乳剤	サンヨール	○	○						○											高温時には薬害が出る恐れがある。
	1B	イミシアホス液剤	ネマキック液剤																○			
	3A	アクリナトリン水和剤	アーデント水和剤	○		○		○		○												
		トラロメリン水和剤	スカウトフロアブル(劇)	○		○																
		エトフェンプロックス粉剤	トレボン粉剤DL											○								
	4A	チアトキサム水溶剤	アクタラ顆粒水溶剤	○	○			○														
		イミダクロプリド水和剤	アドマイヤー水和剤(劇)	○	○	○		○														
		ジノテフラン水溶剤	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤	○	○	○							○						○			
		ジノテフラン粒剤	スタークル粒剤 アルバリン粒剤	○	○																	
		クロチアニジン水溶剤	ダントツ水溶剤	○	○					○										○		
		ニテンピラム水溶剤	ベストガード水溶剤	○	○					○											○	
	アセタミプリド水溶剤	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○	○	○					○			○									
	4C	スルホキサフロル水和剤	トランスフォームフロアブル	○	○																	
	5	スピノサド水和剤	スピノエース顆粒水和剤					○				○	○									
		スピネトラム水和剤	ディアナSC			○	○						○									
	6	エマメクテン安息香酸塩乳剤	アフーム乳剤			○	○					○	○						○			
		ミルベメクテン水和剤	コロマイト水和剤										○									
		レピメクテン乳剤	アニキ乳剤			○														○		
		アバメクテン乳剤	アグリメック(劇)			○	○					○										
	9B	ピメロジン水和剤	チェス顆粒水和剤	○	○																	
		ピリフルキナゾン水和剤	コルト顆粒水和剤	○	○																	
	9C	フロニカミド水和剤	ウララDF	○	○																	
	10A	ヘキシチアゾクス水和剤	ニッソラン水和剤										○									
	10B	エトキサゾール水和剤	パロックフロアブル										○									
	13	クロルフェナビル水和剤	コテツフロアブル(劇)							○	○	○	○							○		キュウリの幼苗期(1~3葉期)には薬害を生ずる場合があるので使用しない。

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	ウリノメイガ	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	ウリハムシ	スジブトホコリダニ	ハスモンヨトウ	カメムシ類	ネコブセンチュウ	クロバネキノコバエ類	備考
--------	--------	-----	-----	--------	---------	--------	-----------	--------	-------------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------	-----------	---------	-------	----------	------------	----

定植後・殺虫剤

15	フルフェノクスロン乳剤	カスケード乳剤								○	○	○										
	ジフルベンズロン水和剤	デミリン水和剤								○												
	ルフェヌロン乳剤	マッチ乳剤			○							○										
16	プロフェジン水和剤	アブロード水和剤				※																※オンシツコナジラミ幼虫で適用。
20B	アセキノシル水和剤	カネマイトフロアブル									○											
20D	ピフェナゼート水和剤	マイトコーネフロアブル									○											
21A	ピリダベン水和剤	サンマイトフロアブル(劇)	○	○							○											
	フェンピロキシメート水和剤	ダニロンフロアブル									○											
	トルフェンピラド乳剤	ハチハチ乳剤(劇)	○	○	○							○										皮ふに対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。
21A 25B	フェンピロキシメート・ピフルブミド	ダブルフェースフロアブル									○											
23	スピロテトラマト水和剤	モベントフロアブル	○	○	○						○											
25A	シフルメトフェン	ダニサラバフロアブル									○											
	シエノピラフェン水和剤	スターマイトフロアブル									○											
28	クロラントラニプロール水和剤	ブレバソンフロアブル5										○	○									
	フルベンジアミド水和剤	フェニックス顆粒水和剤										○					○					
	シアントラニプロール水和剤	ベネビアOD	○	○	○							○	○									展着剤は加用しない(薬害)。TPN、ストロビルリン系、銅剤とは混用しない(薬害)。
	テトラニプロール水和剤	兼商ヨーバルフロアブル	○	○	○							○	○				○					ミツバチに対して影響あり。巣箱及びその周辺にかけられないようにする、受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。
30	フルメタキサミド	グレーシア乳剤					○			○	○	○				○						
M10	不明	キノキサリン系水和剤	モレスタン水和剤			○																高温時の薬害に注意。

定植後・常温煙霧・殺虫剤

4A	イミダクロプリド水和剤	アドマイヤー水和剤(劇)	○																			「温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所」で適用。きゅうり(施設栽培)で登録
----	-------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---