

## 果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	ミカンハモグリガ	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケシキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	ヤノネカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカントゲコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ハスモンヨトウ	ミカンバエ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	---------	----------	--------	----------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----------	-------	-----------	----------	------------	----------	---------	-------	----

## 苗木・殺虫剤

4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤						○	○													○	
	チアメトキサム	アクタラ粒剤5							○									○					
	ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤、スタークル顆粒水溶剤							○														
	クロチアニジン	ダントツ水溶剤						○	○	○												○	ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。
	アセタミプリド	モスピラン粒剤							○	○													
28	シアントラニリプロール	エクシレルSE						○	○	○											※	※成虫で適用	
12C	BPPS	オマイト水和剤	○		○																		かんきつ(ミカンを除く)で適用。幼木では新芽の生育期間、成木では春芽が硬化するまでの期間は使用を避ける。





## 果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	ミカンハモグリガ	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケシキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	ヤノネカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカントゲコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ハスモンヨトウ	ミカンバエ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	---------	----------	--------	----------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----------	-------	-----------	----------	------------	----------	---------	-------	----

### 殺虫剤

	(気)	マシン油	機械油乳剤95	※1	※2										※3	※3								※1ハダニ類、ハダニ類の越冬卵で適用 ※2サビダニで適用 ※3ヤノネカイガラムシ、その他のカイガラムシで適用 樹勢の弱っている場合は散布しない。			
		マシン油	アタックオイル		○	○									○												
			トモノールS		○											○	※									※幼虫で適用 ・樹勢の弱っている場合は散布しない。	
			ハーベストオイル		○											○											
			還元澱粉糖化物	エコビタ液剤	○	※○			○																		
			ポリグリセリン脂肪酸エステル	フォーモン	○																						
		調合油	サフオイル乳剤		○																						
	1A	アラニカルブ	オリオン水和剤40(劇)						○	○	○	○	○	○	○							○		○	※成虫で適用 ハマキムシ類、ケムシ類、カネタタキ、ヨモギエダシヤクで適用あり ミツバチに対して影響あり。		
	1B	DMTP	スプラサイド乳剤40(劇)													※1	※2	※3	※4	※5			○	※6	※7	かんきつ(みかんを除く)で適用 ※1ユキヤナギアブラムシで適用 ※2チャノキアザミウマで適用 ※3カイガラムシ類およびアカマルカイガラムシ幼虫、サンホーゼカイガラムシ(ナシマルカイガラムシ)幼虫で適用 ※4幼虫～未成熟成虫で適用 ※6ツノロウムシ・ルビーロウムシ幼虫で適用 ※6・※7成虫で適用 ミツバチに対して影響あり。	
		PAP	エルサン乳剤(劇)					○	○	○						○							○	○	※2	※3	※1カイガラムシ類(ヤノネカイガラムシを除く)で適用 ※2成虫で適用 ※3成虫で適用 ミツバチに対して影響あり。
		MEP	スミチオン乳剤						○			○	○	○	○	※										○	かんきつ(みかんを除く)で適用 ※ナシマルカイガラムシ(サンホーゼカイガラムシ)で適用 カネタタキ、ハマキムシ類、ミカンツボミタマバエに適用あり。 ミツバチに対して影響あり。
	2B	エチプロール	キラップフロアブル					○								※										※チャノキアザミウマで適用 カネタタキで適用あり 着色始期以降での使用は、果実に薬害を生ずる恐れがあるので使用しない。 ミツバチに対して影響あり。	
	2B 3A	エチプロール・シラフルオフェン	キラップJ水和剤					○			○	○	※2												※1成虫で適用 ※2チャノキアザミウマで適用 ケムシ類でも適用あり ミツバチに対して影響あり。		

## 果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	ミカンハモグリガ	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケシキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	ヤノネカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカントゲコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ハスモンヨトウ	備考

### 殺虫剤

3A	シベルメトリン	アグロスリン水和剤(劇)						○					※	○										※チャノキイロアザミウマで適用 ミツバチに対して影響あり。
	ベルメトリン	アデオン乳剤						○	○				※	○										※チャノキイロアザミウマで適用 ミツバチに対して影響あり。
	ピフェントリン	テルスター水和剤						○	○				※	○										※チャノキイロアザミウマで適用 ミツバチに対して影響あり。
	フルバリネート	マブリック水和剤20(劇)						○	○		○	○	※	○										かんきつ(みかんを除く)で適用 ※チャノキイロアザミウマで適用 ケムシ類でも適用あり
	クロルピリホス	ダーズバンDF(劇)												※	○									かんきつ(みかんを除く)で適用 ※ミカンキイロアザミウマで適用 クワゴマダラヒトリでも適用あり ミツバチに対して影響あり。
	クロルピリホス	ダーズバン乳剤40(劇)						○									※	○						かんきつ(みかんを除く)で適用 ※若齢幼虫で適用 ハマキムシ類、クワゴマダラヒトリ 幼虫でも適用あり ミツバチに対して影響あり。
	フェンプロパトリン	ロビンフッド																				※		※カミキリムシ類で適用 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射
4A	チアメキサム	アクタラ顆粒水溶剤						○	○		○	○	○	○			○	○			※1	※2	※1成虫で適用 ※2成虫、幼虫で適用 ミツバチに対して影響あり。	
	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)						○	○				○	○	○			○			※	○	※成虫で適用 ミツバチに対して影響あり。	
	ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤、スタークル顆粒水溶剤						○	○		○	○	※1	○	※2	○		○	※3		○	○	※1チャノキイロアザミウマで適用 ※2アカマルカイガラムシ、サン ホーゼカイガラムシで適用 ※3コナジラミ類で適用 チャノミドリヒメコバヤ・アオバハ ゴロモに適用あり ミツバチに対して影響あり。	
	クロチアニジン	ダントツ水溶剤						○	○	○	○	○	○	○	○	※1		※2		※3	○	※4	※1アカマルカイガラムシ、ナシマル カイガラムシで適用 ※2ツノロウムシで適用 ※3コナジラミ類で適用 ※4ミカンバエは2000倍を推奨 カネタタキにも適用あり ミツバチおよびマルハナバチに対 して影響あり。	
	クロチアニジン	ダントツ水溶剤						○													○		ミツバチおよびマルハナバチに対 して影響あり。	
	ニテンピラム	ベストガード水溶剤						○					○											ミツバチおよびマルハナバチに対 して影響あり。
	アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)							○	○	○	○	○	○	○	○				※1		※2	※3	主幹から株元に散布し、葉にかか らないようにする。 ※1コナジラミ類で適用 ※2成虫で適用 ※3ミカンバエは 2000倍を推奨
	アセタミプリド	モスピランSL液剤(劇)							○	○	○	○	○	○	○	○				※1		※2	※3	主幹から株元に散布し、葉にかか らないようにする。 ※1コナジラミ類で適用 ※2成虫で適用 ※3ミカンバエは 2000倍を推奨
4C	スルホキサフル	トランスフォームフロアブル						○					○	○							※		ミツバチに対して影響あり。 ※成虫で適用	

## 果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	ミカンハモグリガ	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケシキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	ヤノネカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカンコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ハスモンヨトウ	ミカンバエ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	---------	----------	--------	----------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----------	-------	-----------	----------	----------	----------	---------	-------	----

### 殺虫剤

	5	スピノサド	スピノエースフロアブル						○	※		○												※ナミアゲハで適用 ヨモギエダシャクにも適用あり ミツバチに対して影響あり。
		スピネトラム	ディアナWDG						○	○		○							※		○			※コナジラミ類で適用 ヨモギエダシャク、ケムシ類、ハマ キムシ類に適用あり。ミツバチに対 して影響あり。
	6	レピメクテン	アニキ乳剤			○	○		○	○		※												かんきつ(みかんを除く)で適用 ※チャノキイロアザミウマで適用 ミツバチおよびマルハナバチに対 して影響あり。
		アバメクテン	アグリメック(劇)			○	○		○			○												ナメクジ類にも適用あり ミツバチおよびマルハナバチに対 して影響あり。
		ミルベメクテン	コロマイト水和剤	○		○	○																	ミツバチに対して軽度の影響あり。
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤						○			※1			○				※2			※3		※1チャノキイロアザミウマで適用 ※2コナジラミ類で適用 ※3成虫で適用 ミツバチに対して影響あり。
	10B	エトキサゾール	パロックフロアブル		○	○																		かんきつ(みかんを除く)で適用
	12C	BPPS	オマイト水和剤	○		○																		かんきつ(ミカンを除く)で適用。幼 木では新芽の生育期間、成木では 春芽が硬化するまでの期間は使 用を避ける。また、果実の肥大期 ～着色初期の散布は着色むらを 生じることがあるので使用を避 ける。
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)			○	○					※										○		※ネギアザミウマを除く カネタタキに適用あり ヨモギエダシャクに適用あり ミツバチに対して影響あり。
	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤			○			○			※												※チャノキイロアザミウマで適用ヨ モギエダシャクに適用あり
		ジフルベンズロン	デミリン水和剤						○			※												※チャノキイロアザミウマで適用
	16	ルフェスロン	マッチ乳剤			○			○	○		※												かんきつ(みかんを除く)で適用 ※チャノキイロアザミウマで適用 ヨモギエダシャクに適用あり
		ブプロフェジン	アブロード水和剤												※1					※2				かんきつ(みかん、すだちを除く)で 適用 ※1幼虫で適用 ※2若齢幼虫で適用
		ブプロフェジン	アブロードフロアブル												※1					※2				かんきつ(みかん、すだちを除く)で 適用 ※1幼虫で適用 ※2若齢幼虫で適用
	19	アミトラズ	ダニカット乳剤20		○	○													※					かんきつ(みかんを除く)で適用 ※幼虫で適用 ミツバチに対して影響あり。
	20B	アセキノシル	カネマイトフロアブル		○	○	○																	
	20D	ピフェナゼート	マイトコーネフロアブル		○	○																		
	21A	ピリダベン	サンマイト水和剤(劇)		○	○	○					※1								※2				※1チャノキイロアザミウマで適用 ※2若齢幼虫で適用 ミツバチに対して影響あり。
		フェンピロキシメート	ダニトロンフロアブル		○	○																		
		トルフェンピラド	ハチハチフロアブル(劇)			○	○	○				○						○	※1		○		※2	※1コナジラミ類で適用 ※2成虫で適用 カネタタキ、ヨモギエダシャク・ヨ コバイ類に適用あり ミツバチに対して影響あり。

## 果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	ミカンハモグリガ	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケシキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	ヤノネカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカンコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ハスモンヨトウ	ミカンバエ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	---------	----------	--------	----------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----------	-------	-----------	----------	----------	----------	---------	-------	----

### 殺虫剤

	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル																					○	ミツバチに対して影響あり。	
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル		○	○	○						○		○										ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。	
		スピロジクロフェン	ダニエモンフロアブル		○	○	○																			
		スピロメシフェン	ダニゲッターフロアブル		○	○	○						※													※チャノキイロアザミウマで適用
	25A	シエノピラフェン	スターマイトフロアブル		○		○																			
		シフルメトフェン	ダニサラバフロアブル		○																					
	25B	ピフルピミド	ダニコンゲフロアブル		○																					
	28	シアントラニリブロール	エクシレルSE						○	○	○	○	○									※	○	5000倍(収穫前日まで) ※成虫で適用 ハマキムシ類、ケムシ類、ヨモギエダシヤク、チャノミドリヒメヨコバイに適用あり マメコバチに対して影響あり。		
		シクラニリブロール	テツパン液剤						○	○	○	○	○										※	※成虫で適用 ケムシ類に適用あり ミツバチに対して影響あり。		
		フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤						○	○																ハマキムシ類、ケムシ類に適用あり
		フルベンジアミド	フェニックスフロアブル						○																	ハマキムシ類、ケムシ類、ハスモンヨトウ、ヨモギエダシヤクに適用あり
	29	フロニカミド	ウララ50DF					○					○												かんきつ(みかんを除く)で適用	
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)			○							○													
	UN	硫黄	サルファーゾル			○																				
	6 10B	アバメクチン・エトキサゾール	メビウスフロアブル(劇)		○	○	○		○				○												かんきつ(みかんを除く)で適用 ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。	
	2B 4A	イミダクロプリド・エチブロール	アドマイヤープラスフロアブル(劇)					○	○				○	○				○				※		※成虫で適用 ミツバチおよび野生ハナバチ類に対して影響あり。		
	25A 21A	シエノピラフェン・ピリダベン	スターマイトプラスフロアブル(劇)		○	※	○																		※サビダニ類で適用 ミツバチに対して影響あり。	
	25B 21A	ピフルピミド・フェンピロキシメート	ダブルフェースフロアブル		○	○	○																			
	—	メタアルデヒド	マイキラーL																						カタツムリ類・ナメクジ類	
	—	メタアルデヒド3%	ナメクリーン3																						カタツムリ類・ナメクジ類	

### 無人航空機・殺虫剤

	4A	クロチアニジン	ダントツ水溶剤					○	○	○	○	○	○	○	※ <sub>1</sub>	※ <sub>2</sub>	○	○	○	○	○	○	○	ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。	
	6	アバメクチン	アグリメック(劇)			○	○		○				○												ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。
	2B 4A	イミダクロプリド・エチブロール	アドマイヤープラスフロアブル(劇)					○	○				○	○								※	※	※成虫で適用 ミツバチおよび野生ハナバチ類に対して影響あり。	