

作物1-12. 稲・無人ヘリ・無人航空機用・殺菌剤

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	いもち病	紋枯病	稲こやし病	白葉枯病	こま葉枯病	ウンカ類	ウンカ類幼虫	ヒメトビウンカ	ツマグロヨコバイ幼虫	ツマグロヨコバイ	コブノメイガ	ニカメイチュウ	フタオビコヤガ	カメムシ類	イナゴ類	スクミリンゴガイ	イネドロオウムシ	WCS用稲に使用可	飼料用米(粳)に使用可	備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	-------	------	-------	------	--------	---------	------------	----------	--------	---------	---------	-------	------	----------	----------	-----------	-------------	----

(粒剤)

3		シメコナゾール	モンガリット1キロ粒剤	○		○															○	○	墨黒穂病にも適用あり。
16.3		トルプロカルブ	サンプラス粒剤18	○																	○	○	もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病にも適用あり。
16.1		ピロキロン	コラトップ粒剤24	○																	○	○	—
P02		プロベナゾール	オリゼメート粒剤20	○																	○	○	—
		プロベナゾール	オリゼメート粒剤40	○																	○	○	—
4A		ジノテフラン	スタークル1キロH粒剤 スタークルメイト1キロH粒剤						○		○				○	○					○	○	粒剤は大型種カメムシ類では効果が劣る。
不明		磷酸第二鉄	スクミンバイト3																○		○	○	—
不明		メタアルデヒド	スクミン																○		○	○	—

作物1-13. 稲・無人ヘリ・無人航空機用・殺虫剤

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	いもち病	紋枯病	稲こやし病	白葉枯病	こま葉枯病	ウンカ類	ウンカ類幼虫	ヒメトビウンカ	ツマグロヨコバイ幼虫	ツマグロヨコバイ	コブノメイガ	ニカメイチュウ	フタオビコヤガ	カメムシ類	イナゴ類	スクミリンゴガイ	イネドロオウムシ	WCS用稲に使用可	飼料用米(粳)に使用可	備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	-------	------	-------	------	--------	---------	------------	----------	--------	---------	---------	-------	------	----------	----------	-----------	-------------	----

(液剤)

2B		エチプロール	キラップフロアブル						○										○		○	○	ミツバチに対して影響あり。
3A		エトフェプロックス	トレボンエア-						○		○	○	○	○	○	○					○	○	ミツバチに対して影響あり
		エトフェプロックス	トレボンスカイMC								○										○	○	—
4A		ジノテフラン	スタークル液剤10 スタークルメイト液剤10						○		○										○	○	ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークルエア-50 スタークルメイトエア-50						○												○	○	—
4F		フルピリミン	エミリアフロアブル						○		○								○		○	○	—
11A		BT	チューンアップ顆粒水和剤													○							—
16		ブプロフェジン	アブロードソル							○		○									○	○	—
18		テブフェノジド	ロムダンエア-												○	○					○	○	—
3A 4A		エトフェプロックス・ジノテフラン	トレボンスターフロアブル						○		○	○	○	○	○	○					○	○	ミツバチに対して影響あり
4A 16		ジノテフラン・ブプロフェジン	アブロードスタークルソル						○		○										○	○	ミツバチに対して影響あり
4A UN		ジノテフラン・ベンズピリモキサ	オーケストラスタークルエア-						○												○	○	ミツバチに対して影響あり

作物1-14. 稲・無人ヘリ・無人航空機用・殺虫殺菌剤

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	いもち病	紋枯病	稲こじ病 (葉枯病)	変色病 (葉枯病)	稲こじ病 (葉枯病)	ごま葉枯病	ウンカ類	ウンカ類幼虫	ヒメトビウンカ	ツマグロヨコバイ	コブノメイガ	ニカメイテユウ	フタオビコヤガ	カメムシ類	イナゴ類	イネドロオイムシ	スクミリンゴガイ	WCS 用稲に 使用可	飼料用米(へい) 以降も使用可	備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	---------------	--------------	---------------	-------	------	--------	---------	----------	--------	---------	---------	-------	------	----------	----------	-------------------	--------------------	----

(液剤)

16.1	4A	ジノテフラン・フサライド	ラブサイドスタークルフロアブル	○							○											○	ミツバチに対して影響あり	
		ジノテフラン・トリシクラゾール水和剤 10.8%	ビームエイトスタークルゾル	○						○		○												ミツバチに対して影響あり
16.1	4C	スルホキサフロル、トリシクラゾール 10.8%	ビームエイトエクスードゾル ビームエイトEXゾル	○						○													ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。	
U14 16.1	4A	ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド	ブレードスタークルゾル	○	○	○			○			○					○					○	内類褐変病、変色米(カーブリア、アルタリア)、籾枯細菌病にも適用あり。ミツバチに対して影響あり	
U14 16.1	4A	ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド	ブレードスタークルRゾル	○					○								○					○	ミツバチに対して影響あり	
U16	2B	エチプロール・テブフロキン	トライKフロアブル	○					○													○	ミツバチに対して影響あり	
7	16 18	テブフェノジド・プロロフェジン・フルトラニル	アブロードロムダンモンカットエア	○						○				○	○	○						○	—	
7	16	プロロフェジン・フルトラニル	アブロードモンカットエア	○						○				○									○	—
7	18 UN	テブフェノジド・ベンズピリモキサン・フルトラニル	オーケストラロムダンモンカットエア	○						○				○	○	○						○	イネツトムシにも適用あり。	
1	4A	ジノテフラン・チオファネートメチル	トップジンスタークルフロアブル	○	○					○												○	○	ミツバチに対して影響あり
16.1 U18 U14	4A	クロチアニジン・トリシクラゾール・バリダマイシン・フェリムゾン	ノンプラスバリダダントツフロアブル	○	○					○														ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

(粒剤)

16.1	4A	ジノテフラン・ピロキロン	コラトップスタークル1キロ粒剤	○																			○	粒剤は大型種カメムシ類では効果が劣る。
------	----	--------------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------