



# 除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生	多年生										源類・ 表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS 用イネに使用可	備考	
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ			コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機
2-15-27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキントリオン	ベッカク1キロ粒剤	一年生及び多年生雑草													○	○			○	
15-27-2	フェントラザミド・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロ	天空1キロ粒剤	一年生雑草	多年生広葉雑草											○	○			○	・移植3日後以降の使用を推奨する。	
		天空フロアブル	一年生雑草及び多年生広葉雑草														○				○
		天空ジャンボ	一年生雑草及び多年生広葉雑草														○				○
14-2-27	ピラクロニル・ピリミノバクメチル・フェンキントリオン	エンペラー豆つぶ250	一年生雑草	多年生広葉雑草											○	○	○	○			
		エンペラー1キロ粒剤	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○				○	
		エンペラーフロアブル	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○		○	
		エンペラージャンボ	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○				○	
2-15	ピリミスルファン・フェノキサスルホン	ガンガン1キロ粒剤	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○			○				○			
15-27-2	フェノキサスルホン・フェンキントリオン・メタゾスルフロ	アカツキフロアブル	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○			○					○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。	
		アカツキ1キロ粒剤	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○			○							
		アカツキジャンボ	一年生雑草及び多年生広葉雑草																		○
		アカツキ豆つぶ250	一年生雑草及び多年生広葉雑草															○			○
0-14-2	ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロ	銀河フロアブル	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○								○		
		銀河1キロ粒剤	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○				○				○		
		銀河ジャンボ	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○			○					○	・コウキヤガラは草丈30cmまでの散布で、除草効果が高い。	
0-27-2	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロ	ディオーレ1キロ粒剤	一年生雑草及び多年生広葉雑草														○			○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
		ディオーレフロアブル	一年生雑草及び多年生広葉雑草																	○	
		ディオーレジャンボ	一年生雑草及び多年生広葉雑草																	○	
27-14-2	フェンキントリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロ	流星1キロ粒剤	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○								○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。	
		流星フロアブル	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○				○				○		
		流星ジャンボ	一年生雑草及び多年生広葉雑草																		○
2-2-15-27	ピラゾスルフロエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMX1キロ粒剤	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○			○					○		
15-27	イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン	キマリテフロアブル	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○			○					○	・早期栽培、砂壌土では早い処理で薬害の恐れがあるので移植後5日以降に使用する。	
		キマリテジャンボ	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○					○			○		
15-0-2	カフェンストール・ダイムロン・メタゾスルフロ	月光1キロ粒剤	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○								○		
		月光フロアブル	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○				○				○		
		月光ジャンボ	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○								○		
4-27-15	クロメブロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド	イネリーグジャンボ	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○								○		
		イネリーグ1キロ粒剤	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○				○				○		
		イネリーグフロアブル	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○								○		・移植5日後以降の使用を推奨する。



# 除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生	多年生										源類・ 表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS 用イネに使用可	備考							
			ノビエ 一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツパイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ			多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ	無人航空機			水口施用	湛水周縁散布					
15・27・2	フェントラザミド・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロン	天空ジャンボ	一年生雑草及び多年生広葉雑草													○	移植後1日～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで)				○	・移植3日後以降の使用を推奨する。					
		天空エア一粒剤	一年生雑草	多年生広葉雑草											○			○	○								
2・15	ピリミスルファン・フェノキサスルホン	ガンガンジャンボ	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ2.5葉期(但し、移植後30日まで)	○	○	○					
		ガンガン豆つぶ250	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			
2・15・27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカクジャンボ	一年生及び多年生雑草													○	移植3日後～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで)				○						
		ベッカク豆つぶ250	一年生及び多年生雑草															○	○	○		○					
15・27・2	イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・プロピリスルフロ	カイリキZジャンボ	一年生雑草	多年生広葉雑草											○	移植後3日～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで)	○			○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。						
		アッパレZ1キロ粒剤	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○			○	○	○	○		
14・2・0	ピラクニル・プロピリスルフロ	アッパレZ400FG	一年生雑草及び多年生広葉雑草													○	移植直後～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで)	○			○	・砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。					
		アッパレZジャンボ	一年生雑草	多年生広葉雑草										○	移植後3日～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで)					○							
		アッパレZフロアブル	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○				○	○	○		
		アッパレZ200FG	一年生雑草	多年生広葉雑草										○		移植後3日～ノビエ3.5葉期(但し、移植後60日まで)		○	○				○	○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。		
アッパレZ200FG	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○								
27・2	テフリルトリオン・プロピリスルフロ	ガツツZフロアブル	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで)	○	○	○	○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。				
		ガツツZジャンボ	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植後3日～ノビエ3.5葉期(但し、移植後60日まで)	○	○			○	○		
		ガツツZ200FG	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○			
27・2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウシコンブリー1キロ粒剤 ポデーガード1キロ粒剤	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3.5葉期(但し、移植後30日まで)	○			○	・後作物となす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 ・移植5日後からの使用を推奨する。				
		カウシコンブリーフロアブル ポデーガードフロアブル	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	・後作物となす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。		
		カウシコンブリージャンボ ポデーガードジャンボ	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	・ノビエ3葉期までの使用を推奨する。 ・後作物となす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
2・27	プロピリスルフロ	フルスコアZ1キロ粒剤	一年生雑草	多年生広葉雑草										○	移植後5日～ノビエ3.5葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	・砂壌土水田や早期水稲ではノビエ3葉期までの使用を推奨する。							
		フルスコアZジャンボ	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○									
2・2・15・27	ピラゾスルフロ	エチル・ピリフタリド・プレチクロール・メソトリオン	一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで)	○			○					
0・27・2・0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロ	シンズイズ豆つぶ250	一年生雑草	多年生広葉雑草											移植後3日～ノビエ3.5葉期(但し、移植後30日まで)	○	○	○	○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。							
		シンズイズジャンボ	一年生雑草及び多年生広葉雑草														○	○			○						
27・14・2	テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン	コメット顆粒	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5葉期(但し、移植後30日まで)	○	○	○						
15・4・2	インダノファン・クロメフロップ・ベンスルフロメチル	マサカリLジャンボ	水田一年生雑草	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後5日～ノビエ2.5葉期(但し、移植後30日まで)	○			○	○	・移植後早い時期の処理で、高温が続く場合には一過性の生育抑制が発生する場合があります。			
27・2・4	テフリルトリオン・トリアファモン・フロピラウキシンフェンベンジル	ストレンクス1キロ粒剤	一年生及び多年生雑草														移植後5日～ノビエ4葉期(但し、移植後30日まで)	○			○	○	・早期栽培では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。				
4・2・27	フロピラウキシンフェンベンジル・ベノキサスラム・ベンゾピシクロン	ウィードコア1キロ粒剤	一年生雑草	多年生広葉雑草										○	移植後7日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	○	・移植後15日までの使用を推奨する。 ・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。						



# 除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										源類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			備考										
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ			多年生イネ科雑草	キシユウスズメノヒエ	無人航空機		水口施用	湛水周縁散布	WCS用イネに使用可							
1	シハロホップブチル	クリンチャー1キロ粒剤	○																	○	①移植後7日～ノビエ4葉期(但し、収穫30日前まで) ②移植後25日～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)	○	○	○	・処理時には3～5cmの湛水を保ち止水する。 ・アゼガヤに適用あり、草丈20cmまでに散布する。					
		クリンチャージャンボ	○																		○									
		クリンチャーEW	○																		○	移植後20日～ノビエ6葉期(但し、収穫30日前まで)			○	・散布薬液は使用当日に調製し、展着剤を加用する。 ・アゼガヤに適用あり、草丈60cmまでに散布する。				
1・6	シハロホップブチル・ペンタゾン	クリンチャーバスME液剤		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○				○					
6・1	ペンタゾン・メタミホップ	トドメバスMF液剤	一年生及び多年生雑草																	○	移植後15日～ノビエ6葉期(但し、収穫50日前まで)			○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。					
4	フロルピラウキシフェンベンジル	ロイヤント乳剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○	・幼穂形成期以降の散布では葉先の黄化や止葉の下垂が生じることがある。			
2・2	ハロスルフロメチル・メタゾスルフロ	アレイルSC		○	一年生雑草																					○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。			
4	2,4-PA	粒状水中2,4-D			イネ科以外の水田雑草																								○	・雑草が水面下にかくれるくらいまでに湛水して散布し、散布後2～3日は落水しない。
0	ACN	モゲトン粒剤																									○	・極端な砂質土(漏水田)では使用しない。 ・極端な深水で使用すると薬害を生ずることがある。 ・ウキクサ類に適用あり。 ・水口施用は深層・表層剥離で適用。		
2	ビスピリバクナトリウム塩	ノミニー液剤																									○	・茎葉処理剤。 ・湛水状態またはごく浅水状態にして、雑草の茎葉全体に薬剤が付着するようにする。 ・3日以上落水(浅水)状態を保つ。 ・クサネムとイボクサ対策に使用。 ・クサネムは再生する可能性があるが着莢が減少する。 ・イボクサは本田内で再生し、伸長を始めた時期に散布する。		