

## ムギ類の赤かび病の防除について

ムギ類の赤かび病の防除は、第1回目の防除が最も重要です。本年は1月、2月と気温が高く推移し、今後1か月も高く推移すると予想されており、防除時期が早まると考えられることから、下記により適期防除の徹底をお願いします。

### 記

#### 1 防除時期

- ・ 1回目：小麦・裸麦では開花始め  
二条大麦では葍殻抽出期（穂揃期後10日頃）

※同一ほ場で開花がばらつく場合は、開花を認め次第直ちに防除を行う。

- ・ 2回目：第1回目の防除後、7～10日頃
- ・ 3回目：第2回目の防除後、7～10日頃

※穂に症状（桃色のかび）が目立ってくるのは乳熟期以降であるため、症状が見られなくても、3回の防除を必ず実施する。

#### 2 防除薬剤

別表を参照。

#### 3 防除上注意すべき事項

薬剤耐性の発達を避けるため、同一系統薬剤の連用は避ける。



赤かび病の被害穂

表 麦類赤かび病主要防除薬剤 (令和6年3月現在)

殺菌剤 コード	薬 剤 名	適用登録		希釈倍数・使用量 散布液量	使用時期 (収穫前日数)	使用回数
		小麦	大麦			
3	ワークアップフロアブル	○	○	2000～3000倍, 60～150L/10a	収穫7日前まで	3回以内
		ブーム	ブーム	500～750倍, 25L/10a		
		無人航	無人航	10～24倍, 0.8L/10a		
	ワークアップ粉剤DL	○	○	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内
		○	—	1000～2000倍, 60～150L/10a		3回以内
	チルト乳剤25	—	○	150L/10a	収穫7日前まで	1回
		無人航	—	8倍, 0.8L/10a		3回以内
		—	無人航	—		1回
	シルバキュアフロアブル	○	—	2000倍, 60～150L/10a	収穫14日前まで	2回以内
		—	○	—		
ブーム		—	500倍, 25L/10a			
無人航		—	16倍, 0.8L/10a			
トリフミン水和剤	○	○	1000～2000倍, 60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	
	○	—	1000倍, 60～150L/10a		3回以内	
11	ストロビーフロアブル	○	○	2000～3000倍, 60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内
		ブーム	—	500倍, 25L/10a		
	ファンタジスタフロアブル	○	—	2000倍, 60～150L/10a	—	3回以内
		無人航	—	16倍, 0.8L/10a		3回以内
ファンタジスタ顆粒水和剤	○	—	2000～4000倍, 60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	
	—	—	—		3回以内(但し、出穂期以降は2回以内)	
1	トップジンM水和剤	○	—	1000～1500倍, 60～150L/10a	収穫30日前まで	3回以内(但し、出穂期以降は1回以内)
		—	○	150L/10a		3回以内(但し、出穂期以降は2回以内)
		ブーム	—	250倍, 25L/10a		3回以内(但し、出穂期以降は2回以内)
	トップジンMゾル	○	—	1000～1500倍, 60～150L/10a	—	3回以内(但し、出穂期以降は2回以内)
		—	○	1500倍, 60～150L/10a		3回以内(但し、出穂期以降は1回以内)
		無人航	—	8倍, 0.8L/10a		3回以内(但し、出穂期以降は2回以内)
		—	無人航	—		3回以内(但し、出穂期以降は1回以内)
	トップジンM粉剤DL	○	—	3～4kg/10a	収穫14日前まで	3回以内(但し、出穂期以降は2回以内)
—		○	4kg/10a	3回以内(但し、出穂期以降は1回以内)		
スミトップM粉剤	○	○	4kg/10a	—	1回	
7	ミラビスフロアブル	○	—	1500～2000倍, 50～150L/10a	収穫7日前まで	2回以内
		—	○	1500～2000倍, 60～150L/10a		
		ブーム	—	250～500倍, 25L/10a	収穫7日前まで	
		無人航	—	8～16倍, 0.8L/10a		
M07 1	ベフトップジンフロアブル(劇)	○	—	800～1000倍, 60～180L/10a	—	3回以内(但し、出穂期以降は1回以内)
		—	○	1000倍, 60～180L/10a		2回以内(但し、出穂期以降は1回以内)
		ブーム	—	250倍, 25L/10a	—	3回以内(但し、出穂期以降は1回以内)
		無人航	—	8倍, 0.8L/10a		
M04	オーソサイド水和剤80	○	—	600～1000倍, 60～150L/10a	—	4回以内
M02	サルファーゾル	○	○	400倍	収穫14日前まで	—
	石灰硫黄合剤	○	○	50～60倍		—

○：通常散布      ブーム：ブームスプレイヤー      無人航：無人航空機（無人ヘリコプター、ドローン等）

ブーム：少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度運動式地上液剤散布装置