

第二看護学科 **令和7年度一般入学試験問題** 専門科目 (7の1)

答はすべて解答用紙に記入しなさい。

I 次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を付けなさい。

- 1 胃の出口を噴門という。
- 2 静脈血は、二酸化炭素を多く含んでいる。
- 3 大泉門は、生後1～2か月で閉鎖する。
- 4 ナトリウムは、酸・塩基平衡を維持する役割がある。
- 5 アドヒアランスとは、患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って責任をもって治療を受けることである。
- 6 間質性肺炎は、肺胞壁に炎症細胞浸潤や線維化がおきる。
- 7 ダウン症候群は、21番染色体が3本存在する。
- 8 2型糖尿病は、インスリンの絶対的欠乏によっておこる。
- 9 パルボウイルスB19は、咽頭結膜熱（プール熱）の原因である。
- 10 介護保険の第1号被保険者は、60歳以上の者である。
- 11 アドボカシーとは、患者の権利を擁護・代弁することである。
- 12 プライマリヘルスケアとは、人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにするプロセスである。
- 13 自己効力感とは、自己の能力に関して自らが抱いている自信をいう。
- 14 滅菌物を渡すときは、清潔な鑷子の先端が、不潔な鑷子の先端より高い位置にあるように取り扱う。
- 15 酸素流量計の浮子（フロート）がボール型の場合、ボールの下端の目盛りを読む。
- 16 一時的吸引を行うとき、1回の吸引中に陰圧をかける時間は、10秒以内である。
- 17 徒手筋力テスト（MMT）は、6段階で評価する。
- 18 インスリン治療中の患者がシックデイになった時は、インスリン注射を中断するよう指導する。
- 19 クモ膜下出血の他覚的所見の1つに、ケルニッヒ徴候がある。
- 20 災害対策基本法では、高齢者は、防災上の避難行動支援者に位置づけられる。
- 21 加齢は、成長発達した後の退行期の変化を示す。
- 22 幼児の救急処置では、胸骨圧迫と人工呼吸を10：1の割合で行う。
- 23 初乳には、IgAが多く含まれる。
- 24 応急入院は、家族の同意が必要である。
- 25 滅裂思考は、思考のまとまりがない状態をいう。

II 次の 1 ～ 25 の問いについて、適した答を 1 つ選びなさい。

1 平衡感覚をつかさどる神経はどれか。

- (1) 三叉神経
- (2) 迷走神経
- (3) 前庭神経
- (4) 滑車神経

2 心臓の構造について、誤っているのはどれか。

- (1) 心臓壁は、心内膜、心筋層、心外膜の 3 層からなる。
- (2) 僧帽弁は、右心房と右心室の間の右房室口にある。
- (3) 心臓壁は、左右の冠状動脈によって養われる。
- (4) 大動脈弁は、3 つの半月弁からなる。

3 次のうち、誤っている組合せはどれか。

- (1) 下垂体前葉 _____ 成長ホルモン
- (2) 下垂体後葉 _____ カルシトニン
- (3) 膵臓 _____ インスリン
- (4) 副腎髄質 _____ カテコールアミン

4 次のうち、誤っている組合せはどれか。

- (1) アスピリン _____ 血栓症
- (2) ニフェジピン _____ 高血圧
- (3) バンコマイシン _____ マイコプラズマ肺炎
- (4) ファモチジン _____ 消化性潰瘍

5 門脈圧亢進症状について、誤っているのはどれか。

- (1) 食道静脈瘤
- (2) 腹壁静脈の怒張
- (3) 脾臓萎縮
- (4) 直腸静脈瘤

6 免疫について、次の文章の () にあてはまるのはどれか。

樹状細胞やマクロファージは、() と呼ばれる。

- (1) 抗原提示細胞
- (2) 免疫グロブリン
- (3) B 細胞
- (4) 形質細胞

7 生活保護の扶助について、該当しないのはどれか。

- (1) 育児扶助
- (2) 教育扶助
- (3) 出産扶助
- (4) 介護扶助

8 マズローの基本的欲求の階層のうち、承認の欲求はどれか。

- (1) 休息をとりたい
- (2) 尊重されたい
- (3) 他人とかかわりたい
- (4) 自分の能力を発揮したい

9 ストレスが加わったとき、全身に変化が出始める時期はどれか。

- (1) 抵抗期
- (2) 警告反応期
- (3) 慢性期
- (4) 疲憊期

10 非言語的コミュニケーションについて、誤っているのはどれか。

- (1) 患者の手を握ることは、心を安定させる効果がある。
- (2) アイコンタクトで、メッセージを送ることができる。
- (3) 患者と看護師の適度な空間距離は、200cmである。
- (4) 音楽・照明・湿度などの物理的環境が含まれる。

11 ベッドメイキングについて、誤っているのはどれか。

- (1) シーツを敷くときは、ベッドの中央とシーツの中央を合わせる。
- (2) 防水シーツは、ベッドの全面に使用する。
- (3) 上シーツは、表が下になるように広げる。
- (4) 上シーツの足元は、タックをつくる。

12 睡眠について、正しいのはどれか。

- (1) 入眠直後は、レム睡眠である。
- (2) レム睡眠中は、夢を見ない。
- (3) ノンレム睡眠は、加齢に伴い少なくなる。
- (4) ノンレム睡眠中は、眼球運動がみられる。

13 成人男性の持続的導尿で、正しいのはどれか。

- (1) カテーテルは、陰茎を床面と水平になるように持って挿入する。
- (2) カテーテルを挿入後、生理食塩水を注入してバルーンを膨らませる。
- (3) カテーテルは、陰茎を頭側に向けて下腹部に固定する。
- (4) 蓄尿バッグは、膀胱より高い位置に置く。

14 注射法の種類と刺入角度の組合せで、正しいのはどれか。

- (1) 静脈内注射 ————— 皮膚とほぼ平行
- (2) 皮下注射 ————— 10度～30度
- (3) 皮内注射 ————— 45度～90度
- (4) 筋肉内注射 ————— 10度～20度

15 キューブラー・ロスによる終末期患者の死の受容段階で、第1段階はどれか。

- (1) 取り引き
- (2) 否認
- (3) 怒り
- (4) 抑うつ

16 ショックの5徴候について、誤っているのはどれか。

- (1) 蒼白
- (2) 冷汗
- (3) 虚脱
- (4) 徐脈

17 狭心症とその患者の看護で、誤っているのはどれか。

- (1) 胸痛出現時は、ニトログリセリンを内服する。
- (2) ニトログリセリンの使用後は、血圧低下に注意する。
- (3) 胸痛以外の症状にも注意するよう説明する。
- (4) 生活習慣の見直しを指導する。

18 骨髄穿刺を受ける成人の患者の看護で、誤っているのはどれか。

- (1) 体位は、膝胸位にする。
- (2) 骨髄液吸引時は、息を止めるように促す。
- (3) 終了後30分は、安静臥床にする。
- (4) 穿刺後当日は、入浴やシャワー浴は禁止する。

19 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の生活指導について、誤っているのはどれか。

- （１） 禁煙の必要性について説明する。
- （２） 感染予防について説明する。
- （３） 呼吸リハビリテーションをすすめる。
- （４） エネルギー摂取量を制限する必要性について説明する。

20 エリクソンの老年期の発達課題について、正しいのはどれか。

- （１） 統合対絶望
- （２） 親密対孤立
- （３） 自主性対罪悪感
- （４） 勤勉性対劣等感

21 高齢者のせん妄の看護について、正しいのはどれか。

- （１） 家族の面会は控える。
- （２） 転倒防止のために、離床は控える。
- （３） 精神の安静のために、訪室は控える。
- （４） 自宅から慣れ親しんだ物を持参する。

22 高齢者の食事の援助について、誤っているのはどれか。

- （１） 食前に排泄を済ませる。
- （２） 一口目は、水分で口腔内を湿らす。
- （３） 食直後に、唾液腺マッサージや嚥下体操をする。
- （４） 食後は、座位または半座位で安静を保つ。

23 褥婦への退院指導で、正しいのはどれか。

- （１） 「出生届は、生後 7 日以内に提出してください。」
- （２） 「産褥 2 週目には、妊娠前の生活に戻れます。」
- （３） 「沐浴は、授乳後 30 分以内に開始してください。」
- （４） 「性生活は、1 か月健康診査まで控えてください。」

24 低出生体重児の看護で、正しいのはどれか。

- （１） ストレスを最小限にするため、ミニマルハンドリングを行う。
- （２） 刺激を与えるため、オルゴールの音を流す。
- （３） 生活リズムをつけるため、朝は照度を高くする。
- （４） 体重を増やすため、人工乳を積極的に与える。

25 発達障害について、誤っているのはどれか。

- （１） 注意欠如・多動症（ADHD）
- （２） 強迫性障害（OCD）
- （３） 学習障害（LD）
- （４） 自閉症スペクトラム障害（ASD）