

赤潮警報(第2報)

平成25年(2013年)6月14日
山口県水産振興課

漁業者の皆さんへ


徳山湾でヘテロシグマ アカシオが発生しており、引き続き警戒が必要です!

発 生 日: 平成25年5月20日(月)

発 生 海 域: 徳山湾

赤 潮 構 成 種: ヘテロシグマ アカシオ (*Heterosigma akashiwo*)
…好適水温 20~24°C、好適塩分 22~29psu

着色海域の色: 茶褐色



大きさ 8~25 μm × 6~15 μm

確認発生密度:

観測場所	細胞数	備考
県漁協新南陽市支店前	10,800個/ml	6月14日 27.1°C
周南市地方卸売市場水産物市場前	2,150個/ml	6月14日 25.7°C
県漁協 櫛ヶ浜支店前	467個/ml	6月14日 25.0°C
県漁協 下松支店前	50個/ml	6月14日 23.7°C

■本種の赤潮では、以下の濃度が目安となっています。

●赤潮注意報密度 5,000個/ml ●赤潮警報密度(魚類へい死目安) 50,000個/ml

今後の気象条件によっては、広い海域で赤潮が発生する恐れがありますので、以下の点に留意され、特に蓄養魚・養殖魚の取扱いには十分注意し、漁業被害の防止に努めてください。

なお、県としましては、引き続き調査を実施して参りますので、情報の提供などご協力のほどよろしくお願ひします。

- 1 このプランクトンは、日中は表層に、夜間は底層に滞留します。水色や漁模様の急変など、海域監視の強化に努めてください。
- 2 漁港内での蓄養は避けて、活け^{じめ}出荷等の対策を講じてください。
- 3 養殖魚等の場合は、深さの深い生け簀の活用を図り、赤潮発生時には魚の代謝を抑えるために餌止めをし、早期出荷などの対策も検討してください。
- 4 赤潮の発生が確認された場合は、漁協を通じて関係市・水産事務所へすみやかに通報してください。

* 県内の赤潮情報については、海鳴りネットワークのホームページでもご覧いただけます。以下のアドレスにパソコンからアクセスして下さい。

→ <http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16500/suisan-s/akashio.html>

赤潮調査地点

【参考図】
H25.6.14

